

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

更年期世代*に *主に 45 歳から 55 歳の年代のことです

リポビタミンアクティブ

販売名：大正栄養ドリンクV

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

★疲労の回復・予防 ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、冷えやすい・血行が悪い、肩・首・腰又は膝の不調、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい、骨又は歯の衰え ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【用法・用量】

成人（15 才以上）1 日 1 回 1 本（50mL）を服用してください。

※15 才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 1 本（50mL）中

タウリン	1500mg	チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	5mg
ローヤルゼリー	200mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	
ショウキョウ流エキス	0.3mL	（ビタミン B ₂ ）	3mg
	（生姜 300mg に相当）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	5mg
チンピエキス	20mg	ニコチン酸アミド	20mg
	（陳皮 100mg に相当）	イノシトール	50mg
トウキ流エキス S	0.2mL	無水カフェイン	50mg
	（当帰 200mg に相当）		

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸 Na、ポビドン、安息香酸 Na、香料、アルコール、グリセリン（アルコール 0.20mL 以下）

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話03-3985-1800

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——