

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



のどの痛み・はれに

パブロン[®]のど錠

販売名：パブロン[®]のど錠

第3類医薬品 〈口腔咽喉薬〉

- ◆パブロン[®]のど錠は、お口の中ですばやく溶けて、のどの痛み・はれにすぐれた効果を発揮します。
- ◆水なしで、場所を選ばずどこでも服用できます。



使用上の注意



してはいけないこと




(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

- (1) 甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
(むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります)
- (2) トラネキサム酸を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)

② 長期連用しないでください



相談すること



① 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感
精神神経系	めまい
泌尿器	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

④ 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

扁桃炎・咽頭炎(のどの痛み、のどのはれ)、口内炎

用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	2錠  	1日3回 朝昼晩に服用 してください
7才~14才	1錠 	
7才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3) 7才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈錠剤の取り出し図〉



成 分

6錠中

成 分	分 量	はたらき
トラネキサム酸	750mg	口内やのどにおけるはれ・痛みなどの症状を改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	63mg	炎症やアレルギーをおさえる作用があります。
ニコチン酸アミド	60mg	粘膜の機能を正常に働かせる作用があります。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg	
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	

添加物：セルロース、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、クロスボビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、ステアリン酸Mg、香料、オクテニルコハク酸デンプンNa

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 光による変色を防ぐため、内袋(アルミ袋)開封後は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、内袋(アルミ袋)開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/pabron/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)