

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

くり返すいぼ痔、痔の出血・痛みに



販売名：プリザ Gカプセル 第2類医薬品 〈痔疾用内服薬〉

- ◆プリザ Gカプセルは、いぼ痔や痔の出血・痛み・はれに身体の内側から効く飲む痔疾用薬です。
- ◆植物由来の有効成分メリロートエキスが、いぼ痔の原因である痔核のうっ血を内側から改善し、痔核を根元から小さくしていきます。
- ◆1回1カプセル、1日3回の服用でくり返すいぼ痔や痔の出血・痛み・はれに優れた効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること



- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性
があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この
ような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
下痢
- 4 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用
を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください

効 能

次の場合の症状の緩和：痔核（いぼ痔）、痔出血、痔の痛み、痔のはれ

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1 カプセル 	1日3回
15才未満	服用しないこと	

[注意]

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈カプセルの取り出し図〉



成 分

1 カプセル中

成 分	分 量	はたらき
メリロートエキス	50mg	いぼ痔の原因である痔核のうっ血を内側から改善し、いぼ痔を緩和します。

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、黒酸化鉄、大豆レシチン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(高温・多湿下に置かれるとカプセルが軟らかくなることがあります)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)内服以外に使用しないでください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (5)カプセルを切り開くなどして、中身を出さないでください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/preser/>

製造販売元



株式会社 ビオメディクス
東京都港区港南二丁目15番2号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)