

外用消炎鎮痛パップ剤

トクホンハップ(温)

特 長

1. 血行改善

ビタミンEと温感刺激成分のトウガラシエキ스가患部の血行をよくします。

2. すぐれた消炎鎮痛効果

サリチル酸グリコールや ℓ -メントールの作用で炎症や痛みに対するすぐれた効果を発揮します。

3. 左右にわかれて貼りやすいフィルム

ご使用時に貼りやすい、セパレートフィルムを採用しています。

4. すぐれた粘着性・全方向伸縮自在

肌にぴったりフィットし、はがすときも気になる痛みがありません。

5. チャック付き中袋

中袋は保存に適したチャックが付いています。本剤を乾燥から守り品質を保持します。



使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

1) 目の周囲、粘膜など 2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13歳未満の人への使用はさけてください。
2. 患部を清潔にしてから使用してください。
3. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
4. 入浴の1時間前にははがしてください。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
5. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布などで温めないでください。
6. 足の裏に貼ると膏体がはみ出して靴下などに付着することがありますので注意してください。
7. 衣類などに付着した場合には、水又はぬるま湯に浸してから洗い流してください。
8. 強い刺激を感じた場合にはすぐにはがし、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流して、その後よく冷やしてください。


【成分及び分量】有効成分 膏体100g (0.1m²) 中

成 分	分 量	はたらき
ℓ -メントール	0.3g	知覚神経を軽くマヒさせる
$d\ell$ -カンフル	0.5g	痛みをやわらげる
サリチル酸グリコール	1.2g	炎症を抑え痛みをやわらげる
トウガラシエキス	0.036g	血行をよくする
ビタミンE酢酸エステル	0.3g	血行をよくする

添加物としてアクリル酸デンプン、CMC-Na、グリセリン、酸化チタン、酒石酸、水酸化Al、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後は袋のチャックを閉めて保管してください。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



〈1枚サイズ 10cm×14cm〉

大正製薬(株) お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号 東京都港区芝2-28-8

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

株式会社トクホン