



2012年7月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

のどが腫れて痛む場合の
扁桃炎・扁桃周囲炎
漢方トローチ

サトウ くふうげどくとう 駆風解毒湯 エキストローチ

- 駆風解毒湯は、中国の明の時代の医学書「万病回春」に記載されている漢方処方であり、のどがはれて痛む症状に用いられてきました。
- 駆風解毒湯の「うがいをしながらゆっくり飲む」という本来の用法をトローチ剤にすることによって、より服用しやすくしました。
- 薬効成分が長時間のどに接触することで、のどの痛み、はれに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

【用法・用量】

下記の1回服用量を食間又は空腹時に、口中でかまずにゆっくり溶かして服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1個ずつ2個まで	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成分・分量〕6個中

駆風解毒湯乾燥エキス……………1,175mg

(駆風解毒湯)

防 風(ボウフウ) ……………	1.5g
牛 蒡子(ゴボウシ) ……………	1.5g
連 翹(レンギョウ) ……………	2.5g
荊 芥(ケイガイ) ……………	0.75g
羌 活(キョウカツ) ……………	0.75g
甘 草(カンゾウ) ……………	0.75g
桔 梗(キキョウ) ……………	1.5g
石 膏(セッコウ) ……………	2.5g

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、サッカリンNa、香料(*l*-メントール、プロピレングリコールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤は吸湿しやすいためアルミ袋に入れてあります。袋を開封後、万一、シートの裏面が破損(あな等)してしまうと、吸湿して濃褐色に変わることがありますのでご注意ください。



- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号