

sato

セルフメディケーション
税 控除 対象

つらい痛み浸透して効く サロメチールジクロ ゲル[®] すり込んで効く

ジクロフェナク
ナトリウムの浸透力

微香性

関節痛

腱鞘炎

鎮痛消炎薬

サロメチールジクロ[®] 第2類
ゲル 医薬品

■成分・分量 1g中

ジクロフェナクナトリウム…10mg
 l-メントール……………30mg
 添加物として、ヒプロメロース、ヒドロキシ
 プロピルセルロース、エタノール、プロピレ
 ングリコール、その他3成分を含有します。

■効 能

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関
 節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の
 痛み)、肘の痛み(テニス肘な
 ど)、打撲、捻挫

■用法・用量

1日3～4回適量を患部に塗擦し
 てください。ただし、塗擦部位を
 ラップフィルム等の通気性の悪
 いもので覆わないでください。
 なお、本成分を含む他の外用剤
 を併用しないでください。

★15歳未満の小児は使用しな
 いでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守
 してください。(2)本剤は、痛みや
 はれなどの原因となっている病
 気を治療するのではなく、痛みや
 はれなどの症状のみを治療する
 薬剤ですので、症状がある場合
 だけ使用してください。(3)本剤
 は外用にのみ使用し、内服しない
 でください。(4)1週間あたり
 50gを超えて使用しないでくだ
 さい。(5)目に入らないよう注意
 してください。万一、目に入った
 場合には、すぐに水又はぬるま湯
 で洗ってください。なお、症状が
 重い場合には、眼科医の診療を
 受けてください。(6)使用部位に
 他の外用剤を併用しないでくだ
 さい。(7)通気性の悪いもの
 (ラップフィルム、矯正ベルト等)
 で使用部位を覆い、密封状態に
 しないでください。(8)使用後は
 手を洗ってください。

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の
 少ない涼しい所に密栓して保管し
 てください。(2)小児の手の届か
 ない所に保管してください。(3)
 火気に近づけないでください。
 (4)メガネ、時計、アクセサリ等
 の金属類、化繊の衣類、プラス
 チック類、床や家具等の塗装面等
 に付着すると変質することがあり
 ますので、付着しないように注意
 してください。(5)他の容器に入
 れ替えしないでください。(誤用の
 原因になったり、品質が変わるお
 それがあります。)(6)使用期限を
 すぎた製品は、使用しないでくだ
 さい。また、開封後は使用期限内
 であってもなるべくすみやかに使
 用してください。

ジクロフェナク
ナトリウムの
浸透力サラツとして
ベタつきが少ない

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

本製品についてのお問い合わせは、お買い求め
 の店又は下記にお願い申し上げます。
 佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03-5412-7393
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

押して開けて
ください。

ご使用に際し、外箱の説明文を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり
 やすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を
 起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたこ
 とがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる
 人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、
 わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・
 たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を

使用しないでください

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレ
 ルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品
 の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤

2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は
 副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中
 止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売
 者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛 み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(フ ケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、 色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。そ
 の場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんまし ん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆ み、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があら われる。
接 触 皮膚炎、 光 線 過敏症	塗擦部に強いのかゆみを伴う発疹・発赤、 はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい 皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわ れ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状 が全身にひろがることもある。また、日 光があたった部位に症状があらわれた り、悪化することがある。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使
 用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登
 録販売者にご相談ください

サトウ製薬

第2類
医薬品