

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

消化健胃薬

食べすぎ
飲みすぎに

サイスト胃腸薬

第3類医薬品

胃腸は、食べ物を消化吸収し栄養分を体内へ供給する大切な臓器です。食べすぎ、飲みすぎなどでこの機能が衰えると、胃もたれ、胸やけ、消化不良などの不快な症状を生じることがあります。

サイスト胃腸薬は、

- サッと溶けて飲みやすい細粒タイプの消化健胃薬です。
- ウルソデオキシコール酸が胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化を助けることで、脂っこい食事などで起こる胃もたれに効果を発揮します。
- 3つの消化酵素剤が、でんぷん、タンパク質、脂質などの消化を助けます。
- 5つの健胃生薬が、弱った胃腸を整え、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき）や、胃もたれなどの症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

必ずお読みください。



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を、食前又は食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1 包	1日3回
11才～14才	2／3包	
8才～10才	1／2包	
5才～7才	1／3包	
5才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もお読みください

効 能

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、もたれ(胃もたれ)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感

成分・分量

1.0g×3包中

成分名	分量	作用
ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化を助けます。
ビオチン	30mg	でんぷんやタンパク質の消化を助けます。
リパーゼAP6	45mg	脂肪の消化を助けます。
プロザイム6	15mg	タンパク質の消化を助けます。
ケイヒ末	180mg	芳香性・辛味性・苦味性の健胃生薬の働きにより、消化液の分泌を促進し、弱った胃の働きを活発にします。
ウイキョウ末	180mg	
ゲンチアナ末	90mg	
ガジュツ末	60mg	
ショウキョウ末	60mg	

添加物：デキストリン、乳糖水和物、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、無水ケイ酸

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地