

matsu  
kiyo

Pain Relief Patches

鎮痛消炎テープ剤

コリスチックFBテープ5.0

腰痛や関節痛に

フェルビナク **5%** が浸透して効く

肩・腰・関節などの  
つらい  
痛み に効く

7cm×10cm

貼りやすい  
3分割  
フィルム

薬のはたらき

肩こりに伴う肩の痛み

腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)

肘の痛み(テニス肘など)

腰痛

関節痛

筋肉痛

打撲

捻挫

フェルビナク:5.0g

・痛みの元に浸透し、痛みを鎮めます

l-メントール:4.2g

・清涼感による刺激と軽い知覚麻痺で  
痛みを抑えます

トコフェロール  
酢酸エステル:2.3g

・末梢の血行を促進します

グリチルレチン酸:0.19g

・炎症を抑えます

膏体100g中、1枚あたり膏体量0.7g

第2類医薬品

こんな方におすすめ ●肩、腰、関節などのつらい痛みにお悩みの方

【特徴】

- コリスチックFBテープ5.0は鎮痛成分フェルビナクを5.0%配合した鎮痛消炎テープ剤です。
- コリスチックFBテープ5.0はビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)が末梢の血流を促進し、更に、*l*-メントールの働きで心地よい冷感刺激があり、痛みをやわらげます。
- コリスチックFBテープ5.0は目立ちにくい肌色の基布を使用しています。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 1.次の人は使用しないでください。
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4)15歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください。
  - (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 3.連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

- 15歳未満の小児は使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g中

- フェルビナク.....5.0g
- l*-メントール.....4.2g
- トコフェロール酢酸エステル.....2.3g
- グリチルレチン酸.....0.19g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元  
帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

セルフメディケーション  
税 控除 対象

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電 話 (0879) 25-2363  
受付時間 9:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931