

ご使用前に、この説明文をよくお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

平成 27 年 2 月改訂

第 2 類医薬品

コトブキ浣腸 L 40 (情報は小箱に直接記載)

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

連用しないこと（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
- （3）高齢者。
- （4）はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- （5）心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】


12歳以上1回1個（40g）を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
（使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。）
- （3）12歳未満の小児には使用させないこと。
- （4）浣腸にのみ使用すること。

【使用方法】

- ① チューブの先端のキャップをまわしながらとり、容器内の空気を追い出します。
 - ② 体を横向きにするか、かがんだ姿勢にし、挿入チューブの目盛をめやすにゆっくり肛門内に挿入します。挿入する深さは6cm（目盛り）前後が適当です。（滑らかに挿入できない場合は先端周囲に薬液又は、オリーブ油等を塗布すると挿入しやすくなります。）
 - ③ チューブを片手で固定し、他方の手でボトル部分を握りつぶしながらゆっくり薬液を注入します。（容器に多少薬液が残っても効果に差支えありません。）
 - ④ 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。
- ◎無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- ◎冬季は容器を温湯（40℃）に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。



【成分・分量】

本品1個（40g）中

日局 グリセリン： 20.0g

添加物として： ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）

【包装】

40g × 2個入り

40g × 5個入り

【便秘しがちな方のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。
又、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。
（例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等）
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。

お問合せ先 ムネ製薬株式会社 お客様相談室
電話番号：0120－85－0107
受付時間：8：30～17：00（土日祝を除く）

製造販売元  ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用救済制度 ☎0120-149-931

40g enema

Composition：

Each 40g contains 20g of glycerin(JP) and benzalkonium chloride as an additive.

Dosage and Administration：

For patients over 12 years of age, one unit(40g) at a time is administered rectally. If this dosage does not relieve constipation, the same dosage can be administered again.

Indications：

Constipation

Made in Japan