

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などの
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに

塩酸ブソイドエフェドリン・グリチルリチン酸配合

第②類医薬品

ビスティー鼻炎カプセルL

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎症状は、花粉、ハウスダストなどのアレルギーを起こす物質やウイルス、急激な温度の変化などが原因となり、鼻の粘膜に炎症が起こることから生じます。
ビスティー鼻炎カプセルLは、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎のつらい症状にすぐれた効果を発揮する成分を配合した持続性カプセルです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1)

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)

次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3)

次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)

医師の治療を受けている人。
- (2)

妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)

授乳中の人。
- (4)

高齢者。
- (5)

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)

かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7)

次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
- (8)

次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (9)

モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ	
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上（大人）	2 カプセル	2 回
7 才以上15才未満	1 カプセル	
7 才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

(3) カプセルの取り出し方は右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります）

〈PTPシートの取り出し図〉

おしだす



成分・分量

本剤は、4カプセル（1日量）中に次の成分・分量を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8 mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
グリチルリチン酸	45mg	鼻粘膜の炎症をしずめ、鼻炎の症状をおさえます。
塩酸プソイドエフェドリン	120mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりをやわらげます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁やなみだの過剰な分泌をおさえ、鼻みずやなみだ目をやわらげます。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、赤色102号・カラギーナン・ソルビタン脂肪酸エステル（カプセル本体）

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わります。）

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748－88－4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）