

足がつる、筋肉のけいれん、こむらがり

芍薬甘草湯

しゃく やく かん ぞう とう

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

用法・用量

次の量を食前又は食間に、かむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5錠	3回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉
食間とは食後2～3時間を指します。

成分・分量

15錠中 芍薬甘草湯エキス(1/2量) 1.35gを含有しています。
(日局シャクヤク……………3.0g 日局カンゾウ……………3.0g)

上記生薬量に相当します

添加物：還元麦芽糖水アメ、クエン酸、アセスルファムK、スクラロース、香料、ステアリン酸Mg、乳糖

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パッケージ底面及びパウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：JPS 芍薬甘草湯チュアブル錠

漢方製剤

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
次の診断を受けた人。 心臓病
2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)次の症状のある人。 むくみ
(5)次の診断を受けた人。 高血圧、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931