

使用上の注意 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。〔腸間膜静脈硬化症〕長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返されあられる。3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなり、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返されあられる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 飲み過ぎ、食べ過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、食欲不振、もたれ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱、嘔吐、消化不良

用法・用量 成人(15才以上)1回1本、1日3回食前又は食間に服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)食間とは食後2～3時間を指します。(3)生薬成分を配合しているため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には支障がないのでよく振ってから服用してください。

飲み過ぎ・食べ過ぎ

ゴ
レ
イ
オ
ウ
ゲ
五苓黄解



ジェービーエス製薬株式会社
製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町
芳賀台196-1

お客様相談室 ☎045-593-2136

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)封をあけたら飲みきってください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

成分・分量

1本(30mL)中に水製乾燥エキス(I)0.3g(日局タクシャ0.833g日局ブクリョウ0.750g日局ケイヒ0.500g日局チョレイ0.750g日局ビャクジュツ0.750gに相当)水製乾燥エキス(II)0.3g(日局オウレン0.333g日局オウバク0.333g日局オウゴン0.500g日局サンシシ0.333gに相当)添加

物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931