

はきけ・胃の痛み
ファイトップOZneo [胃腸鎮痛鎮痙薬]

「はきけ」、「胃の痛み」は日常起こったときに、早くやわらげたい症状です。
ファイトップOZneoは、鎮痛効果のある「オキセサゼイン」が成分で、胃の中で早く溶け、胃粘膜に対して直接的に作用し、「はきけ」、「胃の痛み」などの症状を速やかに改善します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(2)15才未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛、ねむけ、めまい、脱力感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘
- 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

胃痛、腹痛、はきけ、（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、さしこみ（せんつう疝痛、しよく癢）、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ（おくび）

【用法・用量】

次の量を水又はお湯にて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回まで
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) かまずにすぐ飲み込んでください。（早く溶ける錠剤ですので、成分が口の中に広がると口内にしびれが残ります。）

(3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【成分・分量】

2錠中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	働 き
オキセサゼイン	5mg	胃粘膜に直接作用して、胃の痛み、腹痛、はきけなどをおさえます。

添加物として、セルロース、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC、ケイ酸Al・ヒドロキシプロピルスターチ・セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22