

2014年10月改訂(第6版)※  
2013年10月改訂

必ずこの説明書をお読み  
になってからご使用くだ  
さい。また、必要なときに  
読めるように大切に保管  
してください。

|            |                  |
|------------|------------------|
| 区分         | 一般用医薬品           |
| 日本標準商品分類番号 | 872615           |
| 承認番号       | 21500APZ00937000 |
| 薬価収載       | 未収載              |

|      |          |
|------|----------|
| 貯法   | 室温保存     |
|      | 火気を避けて保存 |
| 使用期限 | 個包装に記載   |

外皮用殺菌消毒剤

第3類医薬品

# ステリコット®α

エタノール含浸綿

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

[ 損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有するため。 ]

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

### その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの判定に影響を及ぼすことがあります。

## 【効能又は効果】

手指・皮膚の殺菌、消毒。医療機器の消毒。

---

#### 【用法及び用量】

袋からエタノール含浸綿を取出し手指・皮膚又は医療機器を拭き取ってください。  
使用したものは、すぐに廃棄してください。

#### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。
- (5) 広範囲に使用する場合などには、気化したアルコールの吸引に注意してください。
- (6) 本剤は引火性があるため、火気（電気メス使用等を含む）には十分注意してください。
- (7) アルコール分がタンパク質を凝固させるので、医療機器等を清浄する際は血清、膿汁等を十分に洗い落としてから使用してください。

#### 【成分及び分量】

薬液100mL中

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 有効成分 | 日局エタノール・・・・・・・・84.2mL |
| 溶剤   | 日局イソプロパノール・・・・・・3.7mL |
| 溶剤   | 日局精製水・・・・・・・・適量       |
| 担体   | 医療脱脂綿                 |

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 火気に近づけないでください。
- (4) 脱脂綿に小さな黒色又は黄色の斑点がある場合がありますが、これは綿花の葉や種子の一部で、変色したもの等ではありません。
- (5) 薬液は浸潤していても、脱脂綿の端部分等が、白く乾燥しているように見える場合があります。
- (6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

お客様相談窓口 TEL 06-6943-8956  
(10:00～17:00 月～金 ただし祝祭日を除く)

#### 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】※

川本産業株式会社  
大阪府中央区谷町2丁目6番4号