



うすめずに
そのまま

持ち運びに
便利!



すっきり
清涼感

細菌・真菌
ウイルス 殺菌・消毒
 口臭除去

第3類医薬品

この説明文書は使用前に必ずお読みください。

△使用上の注意

してはいけないこと ☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は使用しないでください 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (2) 口内のひどいただれのある人 (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

お問い合わせ窓口
 大阪 06-6209-6948
 東京 03-3406-8450
 受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
 電話 0120-149-931

- キャップの内側に目盛りがついています。
- 内溶液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に使用しないでください。



製造番号、使用期限は底面に記載しています。

この製品はキャップを透明フィルムでラッピングしています。

効能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 **用法・用量** うすめずにそのまま適量(約15～20mL)を口に含んで、2～3回うがいをする。これを1日数回行ってください。[用法・用量に関連する注意] ●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●本剤はうがい用のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
成分・分量 1mL中 ポビドンヨード3.5mg(有効ヨウ素として0.35mg) 添加物として エタノール、グリセリン、l-メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分を含有しています。
[成分・分量に関連する注意] 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。**保管および取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)(4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。(5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

MADE IN JAPAN

A32E1 A01 ®:「イソジン」はムンディファーマの登録商標です。