

シオノギ

今日も感じる、つらい

目^{の疲れ}・肩^{こり}・腰^痛

居残り疲労に。

肉体疲労時のビタミンB₁補給

ベリックス[®]
Beプラス

1日1回

飲みやすさへのこだわり

小粒サイズ/
臭いが少ない



第3類医薬品

開封後はチャックを閉じて保存してください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 2. 服用後、下表の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください 軟便、下痢、便秘 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐

【効能・効果】 ○次の諸症状の緩和：筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労（慢性的な目の疲れおよびそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）、便秘 ○脚気 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。」 ○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【成分・分量】 ベリックスBeプラスは、うすい赤色のフィルムコーティング錠で、4錠（成人1日最大量）中に次の成分を含有しています。セトチアミン塩酸塩水和物*（ビタミンB₁誘導体）125mg、リボフラビン（ビタミンB₂）10mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）60μg、ニコチン酸アミド60mg、コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）100mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物400mg

添加物として モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール、アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄を含有しています。

●本剤の服用により尿が黄色くなることがありますがこれは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

【用法・用量】 次の量を食後に水またはぬるま湯でおのみてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2～4錠	1回
11才以上15才未満	2錠	
7才以上11才未満	1～2錠	
7才未満	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管および取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)(4) 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。(5) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにしてください。(6) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内にご使用ください。(7) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。 ※旧名 ジセチアミン塩酸塩水和物

お問い合わせ
窓口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時～17時（土、日、祝日を除く）

副作用被害
救済制度の
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電 話 0120-149-931

この説明文書は
服用前に必ず
お読みください。

®:登録商標 A1

【販売元】シオノギヘルスケア株式会社 大阪府中央区北浜2丁目6番18号

【製造販売元】生晃栄養薬品株式会社

大阪府西淀川区姫里2丁目3番28号