ソーダ風味

アリナミン®

MEDICAL aqua

集中力の維持・改善に



抗疲労成分フルスルチアミン

ビタミンB_2・B_6

タウリン / ローヤルゼリー

ブドウ糖（添加物・矯味剤）

109kcal / 袋

指定医薬部外品

袋のフチ部のお取り扱いにご注意ください★⇦この部分を持ってお開けください

アリナミン®メディカルバランスT ソーダ風味

指定医薬部外品

服用に際して、袋の表示を必ず読むこと

販売名:アリナミン®メディカルバランスT

〔使用上の注意〕 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

〔保管および取扱い上の注意〕 ●凍結させないこと ●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること ●小児の手のとどかない所に保管すること ●使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

集中力の維持・改善にも効くアリナミン

フルスルチアミンに加え、ビタミンB_2・B_6、タウリン、ローヤルゼリーを配合。疲労の回復・予防だけではなく、集中力の維持・改善によく効きます。

〔効 能〕 ●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善 ●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

〔用法・用量〕 15歳以上は1日1回1袋(100mL)を服用してください ●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

〔成 分〕 1袋(100mL)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB_1誘導体)	1.5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB_2リン酸エステル)	2.54mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB_6)	10mg
ニコチン酸アミド	25mg
L-アスパラギン酸ナトリウム水和物	125mg
タウリン(アミノエチルスルホン酸)	1,000mg
無水カフェイン	50mg
ローヤルゼリーエキスS(ローヤルゼリー200mgに相当)	20mg

添加物：プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、pH調整剤

★本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるものなので心配ありません

製造販売元 アリナミン製薬株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-567-087
9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

D2