

乾燥性皮膚用薬

ケラチナミン[®]クロザラエイド

ケラチナミン[®]クロザラエイドは、黒ずみ(※角化症による)・さめ肌の治療薬です。黒ずみ(※角化症による)とは、角質層が厚くなることで、分厚い皮膚が黒っぽく見える状態のことです。さめ肌とは、ザラザラした肌の状態のことです。

製品特長

- 「肌をみずみずしくする効果」と「肌をなめらかにする効果」がある尿素を20%配合。
- 「炎症を鎮める作用」があるグリチルレチン酸とアルニカチンキをW配合。
- 「ガサガサ肌の改善をサポートする作用」があるトコフェロール酢酸エステルを配合。

厚くなった角質をやわらかくし、なめらかでうるおいに満ちた肌に改善していきます。

このような方に

- ザラザラと黒ずんだひじ・ひざが気になる方に。
- 気になる二の腕のさめ肌に。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。



相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

③ 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、さめ肌、手指のあれ、老人の乾皮症

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

- ① 用法・用量を守ってください。
- ② 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③ 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- ④ 外用にのみ使用してください。
- ⑤ 化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量(100g中)

成分	分量	働き
尿素	20.0g	厚くなったり、黒ずんだ角質をやわらかくすることで、皮膚をなめらかにします。
グリチルレチン酸	0.3g	赤みなどの原因となる皮膚の炎症を鎮めます。
アルニカチンキ (アルニカとして)	0.2g (44mg)	赤みなどの原因となる皮膚の炎症を鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	皮膚の血行を促進し、ガサガサ肌の改善をサポートします。

[添加物]ヒアルロン酸Na、グリセリン、ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸オクチルドデシル、セタノール、ステアリルアルコール、ジメチルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、DL-アラニン、グリシン、リン酸二水素K、水酸化Na

<成分・分量に関する注意>

本剤は、わずかに色調の変化がみられることがあります、品質に問題ありません。

保管及び取扱い上の注意

- ① 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ② 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ③ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤ 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

製造販売元



興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14