

この台紙は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

ビタミン含有保健剤 キューピーコーワヒーリング錠

指定医薬部外品

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ◇ 目覚めが悪い、眠りが浅い、寝付きが悪い
 - ◇ 疲れが残る、疲れやすい、体力がない、身体が重い、身体がだるい
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
15歳未満の小児	✕ 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量(2錠中)

エゾウコギ乾燥エキス14.0mg(エゾウコギとして350mg)、オキソアミチン末50.0mg、チヨウジ末20.0mg、カルニチン塩化物50.0mg、ガンマ-オリザノール10.0mg、チアミン硝化物(V.B₁)10.0mg、リボフラビン(V.B₂)4.0mg、ニコチン酸アミド12.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)5.0mg、

L-アスコルビン酸ナトリウム112.6mg(L-アスコルビン酸(V.C)として100mg)

〔添加物〕セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、青色二号、カルナウバロウ〈成分・分量に関連する注意〉ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。(5) 容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。(6) 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。(7) ラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。(8) 使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00