

Kowa

# 胃腸薬 キャベジン コーワ α<sup>+</sup> 顆粒

## 胃もたれ、 胃痛、 むかつきに

弱ってきた胃を  
正常に戻していく

のみやすい  
顆粒タイプ



胃粘膜を  
修復する  
**MMSC**  
(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)

弱った胃を元気にする生薬  
**ソヨウ・コウボク** 乾燥  
エキス

脂肪の分解を早める  
**リパーゼAP12**

第2類医薬品

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
  2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。排尿困難 (6)次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

開け口

この外箱は、服用の際にはよく読み、  
大切に保管してください。

## 胃もたれ、胃痛、むかつきに 荒れて傷んだ胃粘膜を修復し 弱ってきた胃を正常に戻していく

刺激から  
胃を守る

**粘膜修復作用**  
荒れた胃粘膜を  
修復する

**制酸作用**  
過剰な胃酸分泌を抑え、  
出過ぎた胃酸を中和する

**健胃作用**  
弱った胃の働きを  
元気にする

**消化作用**  
脂肪などの  
消化を促進する

胃の働きを  
取り戻していく

#### ■効能・効果

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755  
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

製造販売元 **興和株式会社**  
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

#### ■用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
8歳未満の小児	×服用しないこと	

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### ■成分・分量(3包:3.9g中)

メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg、炭酸水素ナトリウム 600.0mg、水酸化マグネシウム 210.0mg、沈降炭酸カルシウム 1340.0mg、ロートエキス3倍散 90.0mg(ロートエキスとして30.0mg)、ソヨウ乾燥エキス 20.0mg(ソヨウとして180.0mg)、コウボク乾燥エキス 15.0mg(コウボクとして180.0mg)、センブリ末 30.0mg、ピオチアスターゼ2000 24.0mg、リパーゼAP12 15.0mg

[添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、トウモロコシデンプン、硬化油、D-マンニトール、乳酸Ca、スクラロース、L-メントール、二酸化ケイ素、香料、デキストリン

#### ■保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱及び分包に記載)をすぎた製品は服用しないでください。