

袋のフチ部のお取り扱いにご注意ください ★ ←この部分を持ってお開けください

販売名: **キューピーコーワJK**

**指定医薬部外品**

服用に際しては、この袋をよくお読みください

**【使用上の注意】** **相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹等

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【保管及び取扱い上の注意】**(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)凍結させないでください。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

**【効能・効果】**●疲労の回復・予防●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善●虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

**【用法・用量】**成人(15歳以上)1回1袋、1日1回服用してください。(用法・用量に関連する注意)用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

**【成分・分量】**(100mL中)

オキソアミジン 50mg、エゾウコギエキス 30mg(エゾウコギとして600mg)、トチュウ葉流エキス0.2mL(トチュウヨウとして200mg)、タウリン 1500mg、L-アルギニン塩酸塩 50mg、チアミン硝酸物(V<sub>1</sub>) 10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg[リポフラビン(V<sub>2</sub>)として3.93mg]、ピリドキシン塩酸塩(V<sub>6</sub>) 10mg、無水カフェイン 50mg  
[添加物]白糖、果糖ブドウ糖液糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、カンテン、ローカストピーンガム、キサンタンガム、香料、エタノール  
(アルコール0.12mL以下)

(成分・分量に関連する注意)ビタミンB<sub>2</sub>(リポフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色になることがあります。

製造販売元

**興和株式会社**

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター  
03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

A23GH